

CONSTAT DE CHUTE

ETABLISSEMENT :

SERVICE :

DECLARANT :

ETIQUETTE DU PATIENT

<p>AGE DU PATIENT</p> <input type="checkbox"/> Supérieur à 75 ans <input type="checkbox"/> Entre 60 et 75 ans <input type="checkbox"/> Entre 20 et 59 ans <input type="checkbox"/> Entre 3 et 19 ans <input type="checkbox"/> Moins de 3 ans	<p>DATE DE LA CHUTE :</p> <p>HEURE DU CONSTAT DE CHUTE :</p> <p>HEURE PRESUMEE DE LA CHUTE</p>
<p>LIEU DE LA CHUTE</p> <input type="checkbox"/> Chambre. <input type="checkbox"/> Couloir <input type="checkbox"/> Salle de bains.. <input type="checkbox"/> Cabinet de toilette <input type="checkbox"/> Salle de soins.. <input type="checkbox"/> Salle de pansement.... <input type="checkbox"/> Salle de rééducation.... <input type="checkbox"/> Salle à manger... <input type="checkbox"/> Salle d'activité... <input type="checkbox"/> Bloc opératoire <input type="checkbox"/> Salle de réveil <input type="checkbox"/> Escalier <input type="checkbox"/> Autres (préciser) :.....	<p>CIRCONSTANCES DE LA CHUTE</p> <p><u>Chute du fauteuil roulant:</u></p> <p><u>Chute du lit :</u></p> <input type="checkbox"/> avec barrière <input type="checkbox"/> sans barrière <input type="checkbox"/> avec contention <p><u>Chute lors de transferts :</u></p> <input type="checkbox"/> lit-fauteuil <input type="checkbox"/> lit-brancard <input type="checkbox"/> fauteuil-WC <input type="checkbox"/> autres transferts (préciser)..... <p><u>Chute lors de la marche :</u></p> <input type="checkbox"/> avec présence d'un tiers professionnel <input type="checkbox"/> hors présence d'un tiers professionnel <p><u>Chute lors du lever :</u></p> <input type="checkbox"/> avec présence d'un tiers professionnel <input type="checkbox"/> hors présence d'un tiers professionnel <p><u>Autres circonstances</u> (préciser).....</p>
FACTEURS LIES AU PATIENT	
<p><u>Pathologies du patient :</u></p> <p>-pathologie principale :.....</p> <p>.....</p> <p>-Comorbidités :.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> antécédents de chute</p> <p><u>Traitement du patient :</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><u>Degré d'autonomie du patient :</u></p> <input type="checkbox"/> Grabataire : <input type="checkbox"/> Fauteuil roulant manuel <input type="checkbox"/> Marche avec déambulateur <input type="checkbox"/> Marche avec cannes anglaises <input type="checkbox"/> Marche avec canne simple <input type="checkbox"/> Autonome pour la marche	<p><u>Comportement du patient lors de la chute :</u></p> <input type="checkbox"/> Confus <input type="checkbox"/> Agité <input type="checkbox"/> Agressif <input type="checkbox"/> Somnolent <input type="checkbox"/> Sous le coup d'une forte émotion <input type="checkbox"/> Imprégnation éthylique <input type="checkbox"/> Autres :..... <p>.....</p> <p>.....</p> <p><u>Fonctions supérieures :</u></p> <input type="checkbox"/> Normales <input type="checkbox"/> Altérées <input type="checkbox"/> Très déficientes <p><u>Environnement du patient</u></p> <input type="checkbox"/> Vêtement inadaptés <input type="checkbox"/> Chaussures manquantes ou inadaptées

EXEMPLES D' ACTIONS PREVENTIVES ET/OU CORRECTRICES

(non exhaustif)

Interventions liés à la personne

- Accueillir la personne et présenter les locaux
- Informer la personne de l'organisation du service et des risques
- Dédramatiser la situation si antécédents de chute
- Parler calmement et en face de la personne
- Rassurer la personne la mettre en confiance
- Surveiller la prise alimentaire et hydrique et stimuler si besoin

Interventions liés à l'environnement

- Respecter les procédures d'entretien des sols
- Assurer un éclairage convenable
- Laisser la veilleuse de nuit
- Favoriser le calme pour l'endormissement
- Vérifier l'état des pieds
- Vérifier le port de vêtements et chaussures adaptées
- Mettre le lit à hauteur
- Vérifier le blocage du mobilier (fauteuils, lits, fauteuils roulants.....)
- Organiser l'environnement : système d'appel à portée, installation des barrières de sécurité,
- Protéger les accès escaliers, ascenseurs

liés aux troubles cognitifs

- bracelet anti-fugue
- repérage de chambre
- repérage des couloirs (couleurs... ;)

liés aux traitements

- adapter les actions en fonction des effets de traitement
- lever la personne par étape si anti hypertenseurs
- prévoir protections momentanées si diurétiques et les aider à intervalles réguliers pour aller aux toilettes

liés aux troubles sensitifs, moteurs et sensoriels

- proposer matériel de déambulation adaptée et éduquer la personne pour l'utilisation
- évaluer la douleur
- aménagement la chambre et l'environnement proche
- respecter les habitudes de vie
- aider à la marche
- mettre un rehausseur